LA MÉDECINE NUCLÉAIRE

Introduction

par le **Professeur Pierre GALLE**

Laboratoire de biophysique, (Hôpital Henri-Mondor, Créteil)

L'utilisation des radionucléides pour explorer la fonction des organes chez l'homme date des années quarante et très rapidement sont apparues les possibilités uniques offertes en médecine par les traceurs nucléaires. Un seul isotope, l'iode 131, l'un des premiers dont on ait pu disposer à l'époque, permettait à la fois d'apprécier avec une précision inégalée, la fonction d'une glande endocrine, la thyroïde, de faire des images représentant la forme de cette glande, ce qui n'était possible avec aucune autre méthode et, enfin, de traiter efficacement certains dysfonctionnements ou tumeurs thyroïdiennes.

Malgré ce brillant succès immédiat, et quelques autres comme l'utilisation du phosphore 32 dans le traitement de certains cancers du sang, l'utilisation des radioéléments chez l'homme est longtemps restée très limitée et il fallut attendre les années soixante pour assister au véritable essor d'une nouvelle médecine, la médecine nucléaire, dont l'éventail des possibilités apparaît maintenant si vaste qu'il est difficile d'en préciser les limites.

Le moment était donc opportun de faire un bilan des possibilités aujourd'hui offertes par cette discipline en plein développement. Les deux événements importants survenus dans les années soixante, sont la mise au point d'un nouvel instrument d'imagerie, la gamma caméra d'Anger, et l'apparition d'un nouveau traceur, le technétium 99 m. La caméra d'Anger, permettant l'obtention rapide d'images représentant la distribution des isotopes au sein des organes, a remplacé avantageusement les anciens « scanners à balayage ». Cet instrument s'est rapidement perfectionné et diversifié. Certaines caméras permettent par exemple d'obtenir des images représentant la distribution de la radioactivité présente dans l'ensemble du corps d'un adulte en moins de dix minutes avec une remarquable précision. Des tomographies des organes comme le cerveau ou le cœur sont actuellement effectuées en routine grâce à l'association de ces caméras à des ordinateurs.

Le deuxième événement important a été la mise à disposition des services de médecine nucléaire des générateurs de technétium 99 m, un radioélément quasi idéal pour les explorations « in vivo » chez l'homme, compte tenu à la fois de sa période et de ses caractéristiques physiques et chimiques. La période de six heures est en effet à la fois suffisamment longue pour permettre la plupart des explorations, et assez courte pour minimiser l'irradiation du patient. Par ailleurs, l'énergie du rayonnement gamma émis, 140 keV, réalise un bon compromis entre les exigences de la détection externe, correspondant à une énergie suffisamment élevée pour traverser les tissus, mais ne dépassant pas cependant certaines valeurs pour être efficacement détectée par le cristal récepteur.

Il existe aujourd'hui en France une centaine de services de médecine nucléaire, la plupart implantés dans les hôpitaux publics (centres hospitaliers universitaires ou centres anticancéreux). La radioactivité manipulée dans chacun de ces services est élevée, de un à dix curies par semaine, par exemple dans le

service de médecine nucléaire de l'hôpital Henri-Mondor à Créteil, aussi une importance particulière doit être portée dans ces services à la radioprotection.

Cette radioactivité est injectée au patient à des doses très variables (de 1 à 1 000 MBq) suivant les explorations, les doses d'irradiation délivrées aux organes demeurant toutefois modérées, compte tenu des caractéristiques physiques et biologiques des radioéléments ou molécules utilisés.

À côté du technétium 99 m, d'autres radionucléides sont utilisés actuellement, sélectionnés notamment pour leur caractère peu irradiant. C'est ainsi que le krypton 81 m, de période 13 secondes seulement, permet l'exploration de la fonction ventilatoire du poumon au prix d'une très faible irradiation du patient et d'une contamination quasi nulle des locaux et du personnel. De même l'iode 123 de période 13 heures remplace avantageusement l'iode 131 de période 8 jours. Il convient néanmoins de rester vigilant dans l'utilisation de ces isotopes à vie courte car les observations faites après les retombées sur les îles Marshall et plus récemment celles faites en Biélorussie après l'accident de Tchernobyl, incitent à la prudence dans l'utilisation chez l'homme des isotopes de courte période, et à tenir compte tout autant de la dose totale délivrée à un organe, que de son débit.

Dans ce numéro consacré aux applications cliniques les plus courantes de l'utilisation chez l'homme des radionucléides, il n'a pas été fait mention des différentes voies de recherche actuellement engagées avec par exemple comme objectifs, l'amélioration des appareils de détection ou encore la découverte de nouvelles molécules permettant d'explorer la fonction des organes de façon de plus en plus précise.

Les progrès de l'immunologie laissent espérer l'obtention de molécules marquées d'affinité extrêmement spécifique et dont l'injection chez l'homme permettra d'apprécier une fonction cellulaire donnée ou de reconnaître l'emplacement d'une tumeur débutante ou de métastases. De nombreuses molécules ont été testées dans ce but depuis une dizaine d'années. Les premiers résultats sont encourageants mais ces « immunoscintigraphies » ne sont pas encore entrées dans la pratique courante.

La place prise par la médecine nucléaire dans l'ensemble des méthodes actuelles d'investigation morphologique et fonctionnelle des organes s'est constamment accrue ces trois dernières années.

Au sein des méthodes d'imagerie (rayons X, RMN, ultrasons), l'intérêt principal de cette méthode est de fournir des données qui sont représentatives non pas seulement de l'anatomie mais aussi et surtout de la fonction des organes, et cet aspect fonctionnel est irremplaçable.

Parmi les autres méthodes d'explorations fonctionnelles, la médecine nucléaire, ne nécessitant aucune intervention compliquée, tel un cathétérisme, est surtout appréciée par son caractère non traumatique, toujours bien tolérée par le patient.